

مساعدة طفلك على النمو بواسطة التطعيم المنتظم

حصول طفلك على جميع التطعيمات في الوقت الموصى به هو واحد من أهم الطرق لحفظ صحة طفلك.

التطعيمات حسب الأعمار

اتبع الجدول الموصى به من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ومركز السيطرة على الأمراض

٤ أشهر
كوفيد-١٩
يوصى بالتطعيم ضد مرض كوفيد-١٩ للجميع
الذين يصل عمرهم إلى ستة أشهر فما فوقها. يرتبط عدد الجرعات الموصى بها على عمر طفلك ونوع لقاح كوفيد-١٩ المستخدم.



١٨-٤ شهراً
للاح شلل الأطفال المعطل
، التهاب الكبد ب رقم ٣،
و الأنفلونزا (سنويًا)



١٥-١٢ شهراً
الحصبة، النكاف و الحصبة
المائية رقم ١، للاح المستدمية
النزلية من النوع ب رقم ٤، للاح
المكورات الرئوية المقتربن رقم
٤، تطعيم فاعل ضد جدري
الماء (الحُمَّاق) رقم ١



٢٣-١٢ شهرًا
التهاب الكبد أ رقم ١،
التهاب الكبد أ رقم ١



١٨-١٥ شهراً
ديتاب رقم ٤



٤ سنوات



الدفتيريا و التيتانوس و السعال
الديكي رقم ٥، للاح شلل
الأطفال المعطل رقم ٤،
الحصبة، النكاف و الحصبة
المائية رقم ٢، تطعيم فاعل ضد
جدري الماء (الحُمَّاق) رقم ٢

مولود جديد
التهاب الكبد ب رقم ١



في شهر الى شهرين
التهاب الكبد ب رقم ٢



الشهران
الدفتيريا و التيتانوس و
السعال الديكي رقم ١،
فيروس الروتا رقم ١، للاح
شنل الأطفال المعطل رقم
١، للاح المستدمية النزلية
من النوع ب رقم ١، للاح
المكورات الرئوية المقتربن
رقم ١



٤ أشهر

الدفتيريا و التيتانوس و السعال
الديكي رقم ٢، فيروس الروتا رقم
٢، للاح شلل الأطفال المعطل
رقم ٢، للاح المستدمية النزلية
من النوع ب رقم ٢، للاح
المكورات الرئوية المقتربن رقم ٢



٤ أشهر

الدفتيريا و التيتانوس و السعال
الديكي رقم ٣، فيروس الروتا
رقم ٣، للاح المستدمية النزلية
من النوع ب رقم ٣، للاح
المكورات الرئوية المقتربن رقم ٣



للحصول على
أحدث المعلومات



تعرف أكثر على كل تطعيم!



التهاب الكبد ب (HepB)، والتهاب الكبد أ (HepA)

يحمي طفلك من فيروس التهاب الكبد B وفيروس التهاب الكبد A الذي يسبب تلف الكبد

ثلاث جرعات (التهاب الكبد ب) (Hep B): عند الولادة، من شهر إلى شهرين (بعد لقاح التهاب الكبد B رقم 1) ومن ٦ إلى ١٨ شهراً (بعد ٤ أشهر من لقاح التهاب الكبد B رقم 2)

جرعتان (التهاب الكبد أ) (HepA): ٢٣-١٢ شهرًا (جرعتان، بفارق ٦ أشهر)

فيروس الروتا (RV): يحمي طفلك من الإسهال الشديد والجفاف

جرعتان: في شهرين أو ٤ أشهر،

ثلاث جرعات: في شهرين، ٤ أشهر و ٦ أشهر

لقاح المستدمية النزلية من النوع ب: يحمي من المستدمية النزلية

من النوع ب التي تسبب التهابات الدماغ وتلفه

أربع جرعات: في عمر شهرين، ٤ أشهر، ٦ أشهر و ١٥-١٢ شهراً

لقاح DTaP (الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي):

يحمي من الخناق (تورم القلب، وقصور القلب)، والسعال الديكي (السعال الديكي)، والكزاز (يسبب تشنجات عضلية مؤلمة تؤدي إلى قفل الفك)

خمس جرعات: عند شهرين، ٤ أشهر، ٦ أشهر، ١٨-١٥ شهراً و ٤-٦ سنوات

لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV): يحمي طفلك من مرض شلل الأطفال، وهو مرض يمكن أن يصيب الذراعين والساقيين بالشلل

أربع جرعات: في شهرين أو ٤ أشهر، من ٦ إلى ١٨ شهراً و في عمر ٤ إلى ٦ سنوات

الحصبة، النكاف و الحصبة الألمانية: يحمي من الحصبة والنكاف

والحصبة الألمانية ("الحصبة الألمانية"، وهي من النوع الأكثر خطورة

من الحصبة التي يمكن أن تؤدي إلى عيوب خلقية عند الأطفال)

جرعتان: في ١٢-١٥ شهراً وفي عمر ٤-٦ سنوات

تطعيم فاعل ضد جدري المائية/الحُماق (VAR): يحمي طفلك من الإصابة بالجدري الماء

جرعتان: في ١٢-١٨ شهراً وفي عمر ٤-٦ سنوات

لقاح المكورات الرئوية المقترن (PCV): يحمي من المكورات الرئوية

(يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب الرئوي، عدوى الدم، والتهاب السحايا)

أربع جرعات: في عمر شهرين، ٤ أشهر، ٦ أشهر و ١٢-١٥ شهراً

الأنفلونزا (زكام): يحمي من فيروس الأنفلونزا

جرعتان: من ٦ إلى ١٨ شهراً (الجرعة الثانية بعد ٢٨ يوماً من الجرعة الأولى)، ثم سنوياً حتى مرحلة البلوغ

كوفيد-١٩: تساعد لقاحات كوفيد-١٩ أجسامنا على تطوير مناعة ضد

الفيروس الذي يسبب كوفيد-١٩ دون أن نمرض



IMMUNIZE
KANSAS
COALITION

Language: Arabic

Version: 5/19/25

قد تتغير التوصيات بمرور الوقت ويمكن أن تختلف حسب الطفل. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول اللقاحات التي يحتاجها طفلك.