

Ayude al crecimiento de su hijo aplicándole las vacunas de rutina

Asegurarse de que su hijo reciba todas las vacunas en los plazos recomendados es una de las maneras más importantes de mantener saludable a su bebé.

Vacunas según la edad

Siga la siguiente programación recomendada por la Academia Americana de Pediatría y el CDC



Recién nacido
HepB #1



1-2 meses
HepB #2



2 meses
DTaP #1,
RV #1, IPV #1,
Hib #1 & PCV #1



4 meses
DTaP #2,
RV #2, IPV #2,
Hib #2 & PCV #2



6 meses
DTaP #3, Hib #3,
RV #3 & PCV #3



6 meses +
COVID-19*

*La cantidad de dosis recomendadas depende de la edad de su hijo y del tipo de vacuna COVID-19 utilizada.



6-18 meses
IPV #3,
HepB #3 &
Influenza (anual)



12-15 meses
MMR #1, Hib #4,
PCV #4 & VAR #1



12-23 meses
HepA #1 &
HepA #2



15-18 meses
DTaP #4



4-6 años
DTaP #5, IPV #4,
MMR #2 & VAR #2



Para obtener la
información más
actualizada.



**IMMUNIZE
KANSAS
COALITION**

**¡Conozca más sobre
cada vacuna!**



Lo que hace cada vacuna

Hepatitis B (HepB), Hepatitis A (HepA): Protege a su niño contra el virus de la Hepatitis B y el virus de la Hepatitis A que pueden causar daño al hígado

Tres dosis (HepB): al nacer, 1-2 meses (1-2 meses después de la HepB #1) y 6-18 meses (4 meses después de la HepB #2)

Dos dosis (HepA): 12-23 meses (2 dosis 6 meses aparte)

Rotavirus (RV): Protege a su bebé de diarrea severa y deshidratación

Dos dosis: a los 2 meses y 4 meses

Tres dosis: a los 2 meses, 4 meses y 6 meses

Hib: Protege en contra de la *Haemophilus Influenzae B* que causa infección en el cerebro y daño cerebral

Cuatro dosis: a los 2 meses, 4 meses, 6 meses y 12-15 meses

DTaP: Protege en contra de la Difteria (Inflamación del corazón, fallo del corazón), Pertusis (tosferina) y el Tétano (causa espasmos musculares dolorosos que pueden paralizar la quijada)

Cinco dosis: a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 15-18 meses y 4-6 años

Polio (IPV): Protege en contra de la polio, una enfermedad que puede paralizar los brazos y piernas.

Cuatro dosis: a los 2 meses, 4 meses, 6-18 meses y 4-6 años

MMR: Protege en contra de el Sarampión, las Paperas, y Rubeóla (La rubeóla es el “sarampión Alemán” una forma mas seria de sarampión que puede causar defectos del nacimiento en los bebés)

Dos dosis: a los 12-15 meses y 4-6 years años

Varicela (VAR): Protege a su niño de la varicela

Dos dosis: a los 12-18 meses y 4-6 años

PCV: Protege contra el neumococo (neumonía, infección de la sangre y meningitis)

Cuatro dosis: a los 2 meses, 4 meses, 6 meses y 12-15 meses

Influenza (Gripe): La vacuna contra el catarro o la gripa protege del virus de la influenza

Dos dosis: 6-18 meses (la segunda dosis 28 días después de la primera). Después una vez al año hasta cuando se es adulto

COVID-19: Las vacunas contra COVID-19 le ayudan a nuestros cuerpos a desarrollar inmunidad contra el virus que causa COVID-19 sin que tengamos que estar enfermos

Se recomienda la vacunación contra el COVID-19 para todos los mayores de 6 meses. La cantidad de dosis recomendadas depende de la edad de su hijo y del tipo de vacuna COVID-19 utilizada.



Version 5/19/25

**IMMUNIZE
KANSAS
COALITION**

Las recomendaciones pueden cambiar con el tiempo y pueden variar según el niño. Hable con un proveedor de atención médica sobre las vacunas que necesita su hijo.