

با واکسین‌های منظم به رشد طفل‌تان کمک کنید.

اطمینان حاصل کنید، که طفل‌تان همه واکسین‌ها را در
زمان توصیه شده دریافت می‌کند این یکی از مهمترین راه
ها برای تضمین سلامتی طفل‌تان هست.

واکسین‌ها در طول عمر

جدول زمانی زیر را که توسط آکادمی طب‌ی اطفال آمریکا و سی
دی سی توصیه شده است، تعقیب کنید.

برای نوزادان ۶-۱۸ ماهه

واکسین پولیو ۳# ، واکسین
سینه بغل ۳#، واکسین
هپاتیت (بی) ۳#
و آنفلونزا (سال به سال
تجویز گردد)



نوزاد

واکسین هپاتیت (بی) ۱#



برای نوزادان ۱-۲ ماهه

واکسین هپاتیت (بی) ۲#



برای نوزادان ۱۲-۱۵ ماهه

واکسین سه‌گانه (سرخکان، کله
چرک و سرخچه) ۱# واکسین
انفلونزا نوع اچ ای بی ۴#
واکسین سینه بغل ۴#
واکسین آبله مرغان ۱#



۲ ماهه

واکسین (دیفتري، کزاز و سیاه
سرفه) ۱#، واکسین
واکسین روتاویروس ۱#،
واکسین آنفلونزا نوع Hib (ب)
، واکسین سینه بغل ۱#



برای نوزادان ۱۲-۲۳ ماهه

واکسین هپاتیت (آ) ۱#
و واکسین هپاتیت (آ) ۲#



۴ ماهه

واکسین (دیفتري، کزاز و
سیاه سرفه) ۲#، واکسین
روتا ویروس ۲# واکسین
پولیو ۲# واکسین انفلونزا
نوع اچ ای بی ۲# واکسین
سینه بغل ۲#



برای نوزادان ۱۵-۱۸ ماهه

واکسین (دیفتري، کزاز و سیاه
سرفه) ۴#



برای اطفال ۴-۶ ساله

واکسین (دیفتري، کزاز و سیاه
سرفه) ۵#، واکسین پولیو ۴#
واکسین سه‌گانه (سرخکان، کله
چرک و سرخچه) ۲#، واکسین
آبله مرغان ۲# و واکسین تقویتی
کووید (در سن ۵ سالگی)



۶ ماهه

واکسین (دیفتري، کزاز و
سیاه سرفه) ۳#، واکسین
انفلونزا نوع اچ ای بی ۳# و
اکسن روتا ویروس ۳#
واکسین سینه بغل ۳#



۶ ماهه+

واکسین کووید ۱۹
تعداد دوزهای توصیه شده بستگی به
سن طفل شما و نوع واکسین
COVID-19 استفاده شده دارد.



برای اطلاعات جدیدتر



IMMUNIZE
KANSAS
COALITION

درمورد هر کدام از
واکسین‌ها بیشتر بدانید!

کاری که هر واکسین انجام می‌دهد

واکسین‌های هیپاتیت بی، هیپاتیت آ:

از طفل شما در برابر ویروس هیپاتیت B و ویروس هیپاتیت A که باعث آسیب به کبد می‌شود، محافظت می‌کند.

سه دوز واکسین (هیپاتیت بی):

در دوران تولد، برای اطفال ۱-۲ ماهه (۱-۲ ماه بعد از تجویز واکسین هیپاتیت بی #۱) و برای اطفال ۶-۱۸ ماهه (۴ ماه بعد از تجویز هیپاتیت بی #۲)

دو دوز از واکسین (هیپاتیت آ):

برای نوزادان ۱۲-۲۳ ماهه (۲ دوز، با فاصله ۶ ماه از هم تجویز گردد)

واکسین روتاویروس : طفل شما را از اسهال شدید و کم آبی

محافظت می‌کند.

دو دوز : در ۲ ماهگی یا ۴ ماهگی یا

سه دوز: در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، و ۶ ماهگی

واکسین آنفلونزا نوع ای بی : طفل شما را در برابر آنفلونزای

هیموفولیس نوع ب که باعث عفونت و آسیب مغزی می‌شود، محافظت می‌کند.

چهار دوز: در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، ۶ ماهگی و ۱۲-۱۵ ماهگی

(واکسین (دیفتی، کزاز و سیاه سرفه):

در برابر دیفتی (تورم قلب، نارسایی قلبی)، سیاه سرفه (سیاه سرفه) و کزاز (باعث اسپاسم های دردناک عضلانی شده که منجر به قفل شدن فک می شود) محافظت می‌کند.

۵ دوز: در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، ۶ ماهگی، ۱۸-۱۵ ماهگی و ۴-۶ سالگی

واکسین پولیو: از طفل شما در برابر بیماری فلج اطفال که می تواند

دست‌ها و پاها را فلج کند، محافظت می‌کند.

چهار دوز: در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، ۶ ماهگی و ۱۲-۱۵ ماهگی

واکسین سه گانه (سرخکان، کله چرک و سرخچه) :

از سرخکان، کله چرک و سرخچه محافظت می‌کند (سرخچه «سرخکان آلمانی» است، شکل جدی‌تری از سرخکان است که می‌تواند منجر به نقایص مادرزادی در نوزادان شود)

دو دوز : در ۱۲-۱۵ ماهگی و ۴-۶ سالگی

واکسن آبله مرغان (وارسیلا) : طفل شما را از ابتلا به آبله مرغان

محافظت می‌کند.

دو دوز : در ۱۲-۱۸ و ۴-۶ سال

واکسین سینه بغل : در برابر پنوموکوک (که می تواند منجر به ذات

الریه، عفونت خون و مننژیت شود)، محافظت می‌کند

چهار دوز: در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، ۶ ماهگی و ۱۲-۱۵ ماهگی

واکسین آنفولانزا (آنفلانزا): از ویروس آنفلانزا محافظت می‌کند

دو دوز: برای نوزادان ۶-۱۸ ماه (دوز دوم ۲۸ روز پس از تزریق اول)، سپس تا زمان جوانی هر سال تجویز گردد.

واکسین کووید ۱۹: واکسن‌های کووید-۱۹ به بدن ما کمک می‌کنند تا

در برابر ویروسی که باعث کووید-۱۹ می‌شود، بدون اینکه ما بیمار شویم، مصونیت ایجاد کند.

واکسیناسیون کووید-۱۹

برای همه افراد که عمر شان ۶ ماه و بالاتر از آن است، توصیه می‌شود. تعداد دوزهای توصیه شده بستگی به سن طفل شما و نوع واکسین کووید-۱۹ استفاده شده دارد.



IMMUNIZE
KANSAS
COALITION

توصیه‌ها ممکن است با گذر زمان تغییر کنند و ممکن است برای هر طفل متفاوت باشند. با یک ارائه دهنده خدمات صحتی در مورد واکسن هایی که طفل شما نیاز دارد، صحبت کنید.

Language: Dari

Version: 5/19/25