

¡Manteniendo a los residentes de Kansas sanos y salvos!

Recomendaciones actualizadas sobre la vacuna contra el sarampión (MMR)

Estas actualizaciones son para los condados con sospecha de transmisión comunitaria y los condados limítrofes.

Cuando las investigaciones de salud pública identifican casos de comidas sin un vínculo claro con otros casos confirmados, o sin vínculo con lugares con potencial conocido de exposición, se sospecha transmisión comunitaria.



BEBÉS (DE 6 A 11 MESES)

Deben recibir una dosis temprana de la vacuna MMR (dosis infantil), y luego seguir con el programa de los CDC:

- Otra dosis de los 12 a los 15 meses y
- Una dosis final de los 4 a los 6 años

Recordatorio: No se debe administrar la vacuna MMR (sarampión, paperas, rubéola y varicela) a niños menores de 12 meses



NIÑOS (MAYORES DE 12 MESES)*

Aquellos que aún no se han vacunado, deben recibir

- Una dosis inmediatamente y
- Una segunda dosis por lo menos 28 días después de la primera dosis.

Aquellos que se vacunaron previamente con una dosis, deben recibir

- Una segunda dosis por lo menos 28 días después de la primera dosis.

* Dos dosis después del primer cumpleaños del niño proporciona protección para toda la vida. Los niños que recibieron una dosis temprana de los 6 a los 11 meses debido a un viaje internacional deben seguir el programa de los CDC para un total de tres dosis:

- Otra dosis de los 12 a los 15 meses (por lo menos 28 días después de la primera dosis) y
- Una dosis final de los 4 a los 6 años



ADOLESCENTES Y ADULTOS

- **Aquellos que se vacunaron previamente con una dosis** de la vacuna MMR deben recibir una segunda dosis.
- **Aquellos que no se han vacunado** deben recibir inmediatamente una dosis de la vacuna MMR y seguir con una segunda dosis por lo menos 28 días después.



¿Tienes preguntas? Comunícate con tu proveedor de atención médica