

**¡Manteniendo a los residentes de Kansas sanos y salvos!**

## **Recomendaciones actualizadas sobre la vacuna contra el sarampión (MMR)**

Estas actualizaciones son para **los condados afectados por el brote actual de sarampión** y los condados adyacentes a Kansas



### **BEBÉS (DE 6 A 11 MESES)**

**Deben recibir una dosis temprana de la vacuna MMR** (dosis infantil), y luego seguir con el programa de los CDC:

- Otra dosis de los 12 a los 15 meses y
- Una dosis final de los 4 a los 6 años

Recordatorio: No se debe administrar la vacuna MMR (sarampión, paperas, rubéola y varicela) a niños menores de 12 meses



### **ADOLESCENTES Y ADULTOS**

- **Aquellos que se vacunaron previamente con una dosis** de la vacuna MMR deben recibir una segunda dosis.
- **Aquellos que no se han vacunado** deben recibir inmediatamente una dosis de la vacuna MMR y seguir con una segunda dosis por lo menos 28 días después.



### **NIÑOS (MAYORES DE 12 MESES) \***

**Aquellos que aún no se han vacunado**, deben recibir

- Una dosis inmediatamente y
- Una segunda dosis por lo menos 28 días después de la primera dosis.

**Aquellos que se vacunaron previamente con una dosis**, deben recibir

- Una segunda dosis por lo menos 28 días después de la primera dosis.

\* Dos dosis después del primer cumpleaños del niño proporciona protección para toda la vida. Los niños que recibieron una dosis temprana de los 6 a los 11 meses debido a un viaje internacional deben seguir el programa de los CDC para un total de tres dosis:

- Otra dosis de los 12 a los 15 meses (por lo menos 28 días después de la primera dosis) y
- Una dosis final de los 4 a los 6 años

¿Tienes preguntas? Comunícate con tu proveedor de atención médica

